

# 中国石油大学(北京)

## 《数学分析》2017-2018-1期末考试题参考答案

Gunning Wu

### I 填空题(每题3分,共15分)

(1) 函数  $y = \sin(\cos x^2)$  的导函数为:  $-\cos(\cos x^2) \sin x^2 2x$

(2) 函数  $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x} & x \neq 0; \\ 0 & x = 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处可导, 则  $\alpha$  的取值范围为:  $\alpha > 1$

(3)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} a^{m-n}$

(4) 数列  $\sqrt[n]{n}, n = 1, 2, \dots, n, \dots$  的最大项为:  $3^{\frac{1}{3}}$

(5) 函数  $\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}$  的渐近线为:  $x - \frac{1}{3}$

(6)  $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$

(7)  $\int \sin^2 x \cos^3 x dx = \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C$

(8) 函数  $y = e^x$  在  $x_0 = 0$  点的带有拉格朗日余项的  $n$  阶泰勒展开式为:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots + \frac{1}{n!} x^n + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, 0 < \theta < 1.$$

(9) 设  $y = x \sinh x$ , 则  $(x \sinh x)^{(100)} = x \sinh x + 100 \cosh x$ .

(10) 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right]$  的积分表达式为:  $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ .

## II 计算题 (本题8分)

极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \sqrt[5]{x^5 + x^4} - \sqrt[5]{x^5 - x^4} \right] &= x \left[ 1 + \frac{1}{5} \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] - x \left[ 1 - \frac{1}{5} \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

## III 计算题 (本题8分)

计算不定积分

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^2 + 5x + 5}{(x^2 - 1)(x + 2)} dx &= \int \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 2} dx \\ &= \int \frac{2}{x - 1} + \frac{-1}{x + 1} + \frac{1}{x + 2} dx \\ &= 2 \ln|x - 1| - \ln|x + 1| + \ln|x + 2| + C\end{aligned}$$

## IV (本题6分)

证明不等式:

$$\frac{b - a}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{b - a}{b} \quad (0 < b < a)$$

证明:

$$\frac{\ln \frac{a}{b}}{b - a} = \frac{1}{\xi}, \xi \in (b, a)$$

所以有:

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}, \xi \in (b, a)$$

## V 作图题 (本题10分)

作出函数

$$y = \frac{(x - 1)^2}{3(x + 1)}$$

的图形。

先求函数的一阶导数:

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x + 1) - (x + 1)^2}{3(x + 1)^2} = \frac{(x + 3)(x - 1)}{3(x + 1)^2}$$




Figure 1: Function of the above.

再求函数的二阶导数:

$$f''(x) = \frac{8}{3(x+1)^3}$$

$x$	$(-\infty, -3)$	$-3$	$(-3, -1)$	$-1$	$(-1, 1)$	$1$	$(1, \infty)$
$f'(x)$	+	0	-	无定义	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	无定义	+	+	+
$f(x)$	convex upward, increasing	local maximum	convex upward, decreasing	no definition	convex downward, decreasing	local minimum	convex upward, increasing

求函数的渐近线: 由题意知:  $x = -1$  为一条竖直渐近线; 另一条渐近线为:  $y = \frac{x}{3} - 1$ .

## VI 计算题 (本题8分)

将多项式  $P(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$  表示为  $(x+1)$  的正整数次幂的多项式。  
解: 因为

$$\begin{aligned} P(-1) &= 5 \\ P'(-1) &= -13 \\ P''(-1) &= 22 \\ P'''(-1) &= -12 \end{aligned}$$

由泰勒公式知:

$$\begin{aligned} P(x) &= 5 + (-13)(x+1) + \frac{22}{2}(x+1)^2 + \frac{-12}{6}(x+1)^3 \\ &= 5 - 13(x+1) + 11(x+1)^2 - 2(x+1)^3 \end{aligned}$$

## VII 证明题 (本题10分)

证明: 若函数 $f(x)$ 满足: (1) 在区间 $[a, b]$ 上可导; (2)  $f(x)$ 为非线性函数。则在区间 $(a, b)$ 内至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 满足:

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$$

证明: 构造辅助函数:

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

根据题意:

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \neq 0, \text{ for some points}$$

因为:

$$F(a) = F(b) = 0,$$

假设:

$$\exists \xi \in (a, b), F(\xi) \neq 0$$

不妨假设:

$$F(\xi) > 0$$

在区间 $[a, \xi]$ 和 $[\xi, b]$ 上分别使用洛尔中值定理, 有:

$$\exists \xi_1 \in (a, \xi), F'(\xi_1) = \frac{F(\xi) - F(a)}{\xi - a} > 0$$

即,

$$f'(\xi_1) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{1}$$

$$\exists \xi_2 \in (\xi, b), F'(\xi_2) = \frac{F(b) - F(\xi)}{b - \xi} < 0$$

即,

$$f'(\xi_2) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{2}$$

对于公式 1和公式 2, 总有一个使得:

$$\exists \eta \in (a, b), |f'(\eta)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$$

## VIII 解答题 (本题10分)

试确定 $a, b$ 的值, 使得:

$$x - (a + b \cos x) \sin x$$

为当 $x \rightarrow 0$ 的5阶无穷小量。解:

$$x - (a + b \cos x) \sin x = x - a \sin x - \frac{1}{2}b \sin 2x \quad (3)$$

利用函数的泰勒展开式:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5)$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^6)$$

$$\begin{aligned} x - (a + b \cos x) \sin x &= x - a \sin x - \frac{1}{2}b \sin 2x \\ &= x - ax + a\frac{1}{6}x^3 - a\frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{2}b \left[ 2x - \frac{1}{6}(2x)^3 + \frac{1}{120}(2x)^5 \right] + o(x^5) \end{aligned} \quad (4)$$

因为展开时为一个5阶无穷小量, 所以有:

$$a = \frac{4}{3}, b = -\frac{1}{3}$$

## IX 解答题 (本题10分)

推出积分 $\int \sin^n x \, dx$ 的递推公式, 并利用该公式计算 $\int \sin^6 x \, dx$ 解:

$$\begin{aligned} \int \sin^n x \, dx &= - \int \sin^{n-1} x \, d \cos x \\ &= - \cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1) \cos^2 x \sin^{n-2} x \, dx \\ &= - \cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1)(1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x \, dx \\ &= - \cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1) (\sin^{n-2} x - \sin^n x) \, dx \end{aligned}$$

所以有:

$$\begin{aligned} n \int \sin^n x \, dx &= - \cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \, dx \\ \int \sin^n x \, dx &= \frac{-1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}\int \sin^6 x \, dx &= -\frac{1}{6} \cos x \sin^5 x + \frac{5}{6} \int \sin^4 x \, dx \\ &= -\frac{1}{6} \cos x \sin^5 x + \frac{5}{6} \left[ -\frac{1}{4} \cos x \sin^3 x + \frac{3}{4} \int \sin^2 x \, dx \right] \\ &= -\frac{1}{6} \cos x \sin^5 x + \frac{5}{6} \left[ -\frac{1}{4} \cos x \sin^3 x + \frac{3}{4} \left( -\frac{1}{2} \cos x \sin x + \frac{1}{2} x \right) \right] + C\end{aligned}$$